

SULIT

NAMA DAN LOGO SEKOLAH

NAMA		TINGKATAN	
------	--	-----------	--

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2008

3472/1

ADDITIONAL MATHEMATICS

Kertas 1

September

2 jam

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. *Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.*
2. *Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Malaysia.*
3. *Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia.*
4. *Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.*

<i>Untuk Kegunaan Pemeriksa</i>		
Kod Pemeriksa:		
Soalan	Markah Penuh	Markah Diperoleh
1	2	
2	4	
3	3	
4	4	
5	3	
6	4	
7	3	
8	4	
9	3	
10	3	
11	2	
12	4	
13	3	
14	3	
15	3	
16	4	
17	3	
18	3	
19	3	
20	3	
21	4	
22	3	
23	3	
24	3	
25	3	
Jumlah	80	

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak.

**THE UPPER TAIL PROBABILITY $Q(z)$ FOR THE NORMAL DISTRIBUTION $N(0, 1)$
 KEBARANGKALIAN Hujung Atas $Q(z)$ BAGI TABURAN NORMAL $N(0, 1)$**

z										Minus / Tolak									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641	4	8	12	16	20	24	28	32	36
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247	4	8	12	16	20	24	28	32	36
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859	4	8	12	15	19	23	27	31	35
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483	4	7	11	15	19	22	26	30	34
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121	4	7	11	15	18	22	25	29	32
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776	3	7	10	14	17	20	24	27	31
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451	3	7	10	13	16	19	23	26	29
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148	3	6	9	12	15	18	21	24	27
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867	3	5	8	11	14	16	19	22	25
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611	3	5	8	10	13	15	18	20	23
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379	2	5	7	9	12	14	16	19	21
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170	2	4	6	8	10	12	14	16	18
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985	2	4	6	7	9	11	13	15	17
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823	2	3	5	6	8	10	11	13	14
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681	1	3	4	6	7	8	10	11	13
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559	1	2	4	5	6	7	8	10	11
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367	1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294	1	1	2	3	4	4	5	6	6
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233	1	1	2	2	3	4	4	5	5
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183	0	1	1	2	2	3	3	4	4
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143	0	1	1	2	2	2	3	3	4
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	0	1	1	1	2	2	2	3	3
2.3	0.0107	0.0104	0.0102								0	1	1	1	1	2	2	2	2
			0.00990		0.00964	0.00939	0.00914				3	5	8	10	13	15	18	20	23
								0.00889	0.00866	0.00842	2	5	7	9	12	14	16	16	21
2.4	0.00820	0.00798	0.00776	0.00755	0.00734						2	4	6	8	11	13	15	17	19
						0.00714	0.00695	0.00676	0.00657	0.00639	2	4	6	7	9	11	13	15	17
2.5	0.00621	0.00604	0.00587	0.00570	0.00554	0.00539	0.00523	0.00508	0.00494	0.00480	2	3	5	6	8	9	11	12	14
2.6	0.00466	0.00453	0.00440	0.00427	0.00415	0.00402	0.00391	0.00379	0.00368	0.00357	1	2	3	5	6	7	9	9	10
2.7	0.00347	0.00336	0.00326	0.00317	0.00307	0.00298	0.00289	0.00280	0.00272	0.00264	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8	0.00256	0.00248	0.00240	0.00233	0.00226	0.00219	0.00212	0.00205	0.00199	0.00193	1	1	2	3	4	4	5	6	6
2.9	0.00187	0.00181	0.00175	0.00169	0.00164	0.00159	0.00154	0.00149	0.00144	0.00139	0	1	1	2	2	3	3	4	4
3.0	0.00135	0.00131	0.00126	0.00122	0.00118	0.00114	0.00111	0.00107	0.00104	0.00100	0	1	1	2	2	2	3	3	4



Example / Contoh:
 If $X \sim N(0, 1)$, then
 Jika $X \sim N(0, 1)$, maka
 $P(X > k) = Q(k)$
 $P(X > 2.1) = Q(2.1) = 0.0179$

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used.

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.

ALGEBRA

$$1 \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$2 \quad a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$3 \quad a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$4 \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$5 \quad \log_a mn = \log_a m + \log_a n$$

$$6 \quad \log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n$$

$$7 \quad \log_a m^n = n \log_a m$$

$$8 \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$9 \quad T_n = a + (n-1)d$$

$$10 \quad S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

$$11 \quad T_n = ar^{n-1}$$

$$12 \quad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, r \neq 1$$

$$13 \quad S_\infty = \frac{a}{1 - r}, |r| < 1$$

CALCULUS / KALKULUS

$$1 \quad y = uv, \frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$2 \quad y = \frac{u}{v}, \frac{dy}{dx} = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$3 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$4 \quad \text{Area under a curve}$$

Luas di bawah lengkung

$$= \int_a^b y dx \text{ or (atau)}$$

$$= \int_a^b x dy$$

$$5 \quad \text{Volume generated}$$

Isipadu janaan

$$= \int_a^b \pi y^2 dx \text{ or (atau)}$$

$$= \int_a^b \pi x^2 dy$$

STATISTICS / STATISTIK

$$1 \quad \bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

$$2 \quad \bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f}$$

$$3 \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N}} = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N} - \bar{x}^2}$$

$$4 \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum f(x - \bar{x})^2}{\sum f}} = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{\sum f} - \bar{x}^2}$$

$$5 \quad m = L + \left(\frac{\frac{1}{2}N - F}{f_m} \right) C$$

$$6 \quad I = \frac{Q_1}{Q_0} \times 100$$

$$7 \quad \bar{I} = \frac{\sum W_i I_i}{\sum W_i}$$

$$8 \quad {}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$9 \quad {}^n C_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

$$10 \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$11 \quad P(X = r) = {}^n C_r p^r q^{n-r}, \quad p + q = 1$$

$$12 \quad \text{Mean / Min}, \quad \mu = np$$

$$13 \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

$$14 \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

GEOMETRY / GEOMETRI

$$1 \quad \text{Distance / Jarak} \\ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$2 \quad \text{Midpoint / Titik tengah}$$

$$(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$3 \quad \text{A point dividing a segment of a line} \\ \text{Titik yang membahagi suatu tembereng garis}$$

$$(x, y) = \left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n}, \frac{ny_1 + my_2}{m+n} \right)$$

$$4 \quad \text{Area of triangle / Luas segitiga}$$

$$= \frac{1}{2} [(x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (x_2 y_1 + x_3 y_2 + x_1 y_3)]$$

$$5 \quad |r| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$6 \quad \hat{r} = \frac{x\hat{i} + y\hat{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Arc length, $s = r\theta$
<i>Panjang lengkok, $s = j\theta$</i> | 8 | $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$
$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$ |
| 2 | Area of sector, $A = \frac{1}{2}r^2\theta$
<i>Luas sector, $L = \frac{1}{2}j^2\theta$</i> | 9 | $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$
$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$ |
| 3 | $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$
$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ | 10 | $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$ |
| 4 | $\sec^2 A = 1 + \tan^2 A$
$\sec^2 A = 1 + \tan^2 A$ | 11 | $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$ |
| 5 | $\operatorname{cosec}^2 A = 1 + \cot^2 A$
$\operatorname{kosek}^2 A = 1 + \cot^2 A$ | 12 | $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ |
| 6 | $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$
$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ | 13 | $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ |
| 7 | $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
$= 2 \cos^2 A - 1$
$= 1 - 2 \sin^2 A$

$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
$= 2 \cos^2 A - 1$
$= 1 - 2 \sin^2 A$ | 14 | Area of triangle / <i>Luas segitiga</i>
$= \frac{1}{2} ab \sin c$ |

Answer **all** questions.
Jawab semua soalan.

- 1 Diagram 1 shows the linear relation f .
Rajah 1 menunjukkan hubungan linear f .






Diagram 1
Rajah 1

- (a) If the image of 6 is q , state the value of q .
Jika imej bagi 6 ialah q , nyatakan nilai q .
- (b) State the type of relation as shown in Diagram 1.
Nyatakan jenis hubungan yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

[2 marks]
[2 markah]




Answer / *Jawapan*: (a) $q = \dots\dots\dots$
(b) $\dots\dots\dots$

2 Given the function $h : x \rightarrow \frac{3-x}{2}$, find

Diberi fungsi $h : x \rightarrow \frac{3-x}{2}$, cari

- (a) the composite function h^2 , [2 marks]
fungsi gubahan h^2 , [2 markah]
- (b) the inverse function, $h^{-1}(x)$. [2 marks]
fungsi songsangan, $h^{-1}(x)$. [2 markah]

Answer / Jawapan: (a)
(b)





3 The quadratic equation $px^2 + (q+1)x + 1 - q^2 = 0$, where p and q are constants, has two real and distinct roots. Express the range of value of p in terms of q .

Persamaan kuadratik $px^2 + (q+1)x + 1 - q^2 = 0$, dengan keadaan p dan q ialah pemalar, mempunyai dua punca nyata dan berbeza.


Ungkapkan julat nilai p dalam sebutan q .

[3 marks]
[3 markah]

Answer / Jawapan:




- 4 Find the range of values of x for which $3(2x^2 - x) \leq 1 - 2x$. [4 marks]
Cari julat nilai x bagi $3(2x^2 - x) \leq 1 - 2x$. [4 markah]




Answer / Jawapan:

-
- 5 Given that $3\log_{10}(xy^2) = 4 + 2\log_{10} y - \log_{10} x$, find the value of $\log_{10} xy$. [3 marks]
Diberi $3\log_{10} xy^2 = 4 + 2\log_{10} y - \log_{10} x$, cari nilai $\log_{10} xy$. [3 markah]



Answer / Jawapan:




- 6 Given that $2^x \times 3^x = 5^{x+2}$, find the value of x .

[4 marks]

Diberi $2^x \times 3^x = 5^{x+2}$, cari nilai bagi x .

[4 markah]

Answer / Jawapan:



- 7 The following sequence is an arithmetic progression.

Jujukan berikut ialah satu jangjang aritmetik.

$$2p + q, 3p + 2q, 4p + 3q, \dots$$



Find S_{10} in terms of p and q .

[3 marks]


Cari S_{10} dalam sebutan p dan q .

[3 markah]

Answer / Jawapan: $S_{10} = \dots$




- 8 (a) The first three consecutive terms of a geometric progression are a , 6, 18.
Find the ninth term. [2 marks]
Tiga sebutan pertama suatu janjang geometri ialah a , 6, 18.
Cari sebutan ke sembilan. [2 markah]
- (b) Express the recurring decimal $1.\dot{0}\dot{2}$ as a fraction in the lowest form. [2 marks]
Ungkapkan perpuluhan berulang $1.\dot{0}\dot{2}$ sebagai satu pecahan tunggal yang termudah. [2 markah]




Answer / Jawapan: (a)
(b)

- 9 P , Q and R are three points on the straight line $2y - x = 4$. Given $PQ : QR = 1 : 4$,
 Q is (2, 3) and P is on the y -axis, find R . [3 marks]
 *P , Q dan R ialah tiga titik pada garis lurus $2y - x = 4$. Diberi $PQ : QR = 1 : 4$,
 Q ialah (2, 3) dan P ada pada paksi- y , cari R .* [3 markah]




Answer / Jawapan:



- 10** In Diagram 2, the straight lines AB and PQ are perpendicular to each other and P is the midpoint of AB .
Given $A(0, 4)$, $B(8, 0)$ and $Q(0, k)$, determine the value of k . [3 marks]


Dalam Rajah 2, garis lurus AB dan PQ adalah berserenjang kepada satu sama lain dan P ialah titik tengah AB .

Diberi $A(0, 4)$, $B(8, 0)$ dan $Q(0, k)$, tentukan nilai bagi k . [3 markah]



Answer / Jawapan:

10
3



- 11 Given $\underline{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ and $\underline{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ and $\overrightarrow{OA} = 2\underline{b} - \underline{a}$. Express \overrightarrow{OA} in the form $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
[2 marks]

Diberi $\underline{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ dan $\underline{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ungkapkan \overrightarrow{OA} dalam bentuk $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, jika
 $\overrightarrow{OA} = 2\underline{b} - \underline{a}$. [2 markah]

11

2

Answer / Jawapan: $\overrightarrow{OA} = \dots\dots\dots$

- 12 *Solution by graph is not accepted for this question.*
Penyelesaian secara graf tidak diterima bagi soalan ini.


OABC is a parallelogram such that $\overrightarrow{OA} = 4\underline{i} + 3\underline{j}$ and $\overrightarrow{OC} = 11\underline{i} + 5\underline{j}$
find the unit vector in the direction of \overrightarrow{OB} . [3 marks]

OABC ialah sebuah segiempat selari dengan keadaan $\overrightarrow{OA} = 4\underline{i} + 3\underline{j}$
dan $\overrightarrow{OC} = 11\underline{i} + 5\underline{j}$, cari vektor unit pada arah \overrightarrow{OB} . [3 markah]

12


3

Answer / Jawapan: $\dots\dots\dots$



- 13 Diagram 3 shows a parallelogram $PQRS$. Given that A lies on the diagonal QS such that $2QA = AS$ and B is the midpoint of RS , express \overrightarrow{AB} in terms of \underline{x} and \underline{y} . [4 marks]

Rajah 3 menunjukkan sebuah segiempat selari $PQRS$. Diberi A terletak pada pepenjuru QS dengan keadaan $2QA = AS$ dan B ialah titik tengah RS , ungkapkan \overrightarrow{AB} dalam sebutan \underline{x} dan \underline{y} . [4 markah]



Answer / Jawapan: $\overrightarrow{AB} = \dots\dots\dots$


13
4

- 14 Given $f(x) = (5 - 3x)^4$, find $f''(2)$. [3 marks]

Diberi $f(x) = (5 - 3x)^4$, cari $f''(2)$. [3 markah]

Answer / Jawapan: $\dots\dots\dots$

14
3




- 15 Two variables p and q are related by the equation $p = 3q + \frac{2}{q}$. Given q increases at a constant rate of 4 units per second when $p = 2$, find the rate of change in p .

Dua pembolehubah p dan q dihubung dengan persamaan $p = 3q + \frac{2}{q}$. Diberi q bertambah dengan kadar malar 4 unit sesaat apabila $p = 2$, cari kadar perubahan bagi p .

[3 marks]

[3 markah]

15



Answer / Jawapan :

- 16 A straight line graph is obtained by plotting $\log_{10} y$ against $\log_{10} x$, as shown in Diagram 4. Find y in terms of x . [4 marks]

Graf garis lurus diperolehi dengan memplotkan $\log_{10} y$ melawan $\log_{10} x$, seperti yang ditunjukkan pada Rajah 4. Cari y dalam sebutan x . [4 markah]






Diagram 4
Rajah 4

16



Answer / Jawapan:




17 Given $y = \frac{k}{(2x-5)^3}$ and $\frac{dy}{dx} = g(x)$, find the value of k if $\int_2^3 [g(x) + 1] dx = 7$.

[3 marks]

Diberi $y = \frac{k}{(2x-5)^3}$ dan $\frac{dy}{dx} = g(x)$, cari nilai bagi k jika $\int_2^3 [g(x) + 1] dx = 7$.

[3 markah]

Answer / Jawapan: $k = \dots\dots\dots$





18 The gradient function of a curve passing through (1, 2) is given by $(3 - 2x)^3$, find the equation of the curve.

[3 marks]

Fungsi kecerunan suatu garis lengkung yang melalui (1, 2) diberi sebagai $(3 - 2x)^3$, cari persamaan garis lengkung itu.

[3 markah]

Answer / Jawapan:




- 19 Diagram 5 shows a four-sided figure $ABCD$. ABC and CDA are two congruent sectors centred at A and C respectively. Given that the area of sector ABC is 12 unit^2 and the length of AB is 4 cm , find the perimeter of the figure $ABCD$.


[3 marks]

Rajah 5 menunjukkan satu bentuk empat sisi $ABCD$. ABC dan CDA ialah dua sektor yang kongruen dengan pusat A dan C masing-masing. Diberi luas sector ABC ialah 12 unit^2 dan panjang AB ialah 4 cm , cari perimeter $ABCD$.

[3 markah]



19




Answer / Jawapan:

- 20 Diagram 6 shows the graph of a curve $y = c + a \cos bx$ for $0 \leq x \leq 2\pi$, where a , b and c are constants. Determine the values of a , b and c .


[3 marks]

Rajah 6 menunjukkan graf suatu garis lengkung $y = c + a \cos bx$ bagi $0 \leq x \leq 2\pi$, di mana a , b dan c ialah pemalar. Tentukan nilai a , b dan c .


[3 markah]



20




Answer / Jawapan: $a = \dots$, $b = \dots$, $c = \dots$



21 Solve the equation $3\cos^2 x + \sin 2x = 0$ for $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ [4 marks]

Selesaikan persamaan $3\cos^2 x + \sin 2x = 0$ bagi $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ [4 markah]



Answer / Jawapan:



22 12 students are shortlisted to participate in three competitions. 4 students are required to take part in a sudoku competition, 3 students are required to take part in a chess competition and another 2 students are required to take part in a quiz competition. Find the number of ways these students can be chosen if a student can only participate in one competition only. [3 marks]

12 orang pelajar telah disenarai pendek untuk menyertai 3 pertandingan. 4 orang pelajar diperlukan untuk menyertai pertandingan sudoku, 3 orang pelajar diperlukan untuk menyertai pertandingan catur dan 2 orang pelajar diperlukan untuk menyertai pertandingan kuiz. Cari bilangan cara pemilihan pelajar-pelajar tersebut jika seorang pelajar hanya dibenarkan untuk menyertai satu pertandingan sahaja. [3 markah]


Answer / Jawapan:



- 23 Bag A contain 1 green pen, 2 red pens and 3 blue pens. Bag B contain 2 black erasers and 3 white erasers. Bag C contain 6 gift cards labeled 1, 2, 3, 4, 5 and 6. An item is picked randomly from each bag. Find the probability of picking a blue pen, a black eraser and a gift card with a number smaller than 3. [3 marks]

Beg A mengandungi 1 pen hijau, 2 pen merah dan 3 pen biru. Beg B mengandungi 2 pemadam hitam dan 3 pemadam putih. Beg C mengandungi 6 kad hadiah yang dilabel 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Satu item dicabut secara rawak daripada setiap beg. Cari kebarangkalian mendapat satu pen biru, satu pemadam hitam dan satu kad hadiah yang berlabel nombor kurang daripada 3. [3 markah]

23



Answer / Jawapan :

- 24 The probability that it will rain on a particular day is $\frac{2}{5}$.

Kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada sebarang hari ialah $\frac{2}{5}$.

If X is the number of rainy days in a week, find

Jika X ialah bilangan hari berhujan dalam seminggu, cari


- (a) the mean of the distribution of X ,
min bagi taburan X ,
- (b) the standard deviation of the distribution of X .
sisihan piawai bagi taburan X .

24



Answer / Jawapan: (a)

(b)



- 25 Diagram 7 shows a standardized normal distribution graph.
Rajah 7 menunjukkan satu graf taburan normal piawai.




Diagram 7
Rajah 7

The probability represented by the area of the shaded region is 0.3643.
Kebarangkalian yang diwakili oleh luas kawasan berlorek ialah 0.3643.

- (a) Find the value of k .
Cari nilai k .
- (b) X is a continuous random variable which is normally distributed with a mean of μ and a standard deviation of 8.
Find the value of μ if $X = 70$ when the z -score is k .

X ialah pembolehubah rawak selanjar bertaburan secara normal dengan min μ dan sisihan piawai 8.

Cari nilai μ jika $X = 70$ apabila skor- z ialah k .


[3 marks]
[3 markah]

Answer / Jawapan: (a)
(b)

25
3

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT

Pahang Trial SPM 2008
<http://edu.joshuatly.com/>
<http://www.joshuatly.com/>



INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consists of **25** questions.
*Kertas soalan ini mengandungi **25** soalan.*
2. Answer **all** questions.
*Jawab **semua** soalan.*
3. Give only **one** answer for each question.
*Bagi setiap soalan beri **satu** jawapan sahaja.*
4. Write your answers in the spaces provided in this question paper.
Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
5. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah.
6. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write down the new answer.
Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.
7. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
8. The marks allocated for each question are shown in brackets.
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.
9. A list of formulae is provided on pages 3 to 5.
Satu senarai rumus disediakan di halaman 3 hingga 5.
10. A four-figure table for the Normal Distribution $N(0, 1)$ is provided on page 2.
Satu jadual empat angka bagi Taburan Normal $N(0, 1)$ disediakan di halaman 2.
11. You may use a non-programmable scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.
12. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.
Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

SULIT

3472/2

3472/2

Form Five

Additional Mathematics

Paper 2

September 2008

2 ½ hours

NAMA DAN LOGO
SEKOLAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2008

ADDITIONAL MATHEMATICS

Paper 2

Two hours and thirty minutes

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. *Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.*
2. *Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Malaysia.*
3. *Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.*
4. *Calon dikehendaki menceraikan halaman 21 dan ikat sebagai muka hadapan bersama-sama dengan buku jawapan.*

Kertas soalan ini mengandungi **21** halaman bercetak.

3472/2

Pahang Trial SPM 2008
<http://edu.joshuatly.com/>
<http://www.joshuatly.com/>

SULIT

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used.

ALGEBRA

$$1 \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$2 \quad a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$3 \quad a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$4 \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$5 \quad \log_a mn = \log_a m + \log_a n$$

$$6 \quad \log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n$$

$$7 \quad \log_a m^n = n \log_a m$$

$$8 \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$9 \quad T_n = a + (n-1)d$$

$$10. \quad S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

$$11 \quad T_n = ar^{n-1}$$

$$12 \quad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad r \neq 1$$

$$13 \quad S_\infty = \frac{a}{1 - r}, \quad |r| < 1$$

CALCULUS
KALKULUS

$$1 \quad y = uv, \quad \frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$2 \quad y = \frac{u}{v}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$3 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$4 \quad \text{Area under a curve} \\ \text{Luas di bawah lengkung} \\ = \int_a^b y \, dx \quad \text{or (atau)} \quad \int_a^b x \, dy$$

$$5 \quad \text{Volume generated} \\ \text{Isipadu janaan} \\ = \int_a^b \pi y^2 \, dx \quad \text{or (atau)} \quad \int_a^b \pi x^2 \, dy$$

STATISTICS
STATISTIK

$$1 \quad \bar{x} = \frac{\Sigma x}{N}$$

$$2 \quad \bar{x} = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$$

$$3 \quad \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{N}} = \sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N} - \bar{x}^2}$$

$$4 \quad \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f(x-\bar{x})^2}{\Sigma f}} = \sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{\Sigma f} - \bar{x}^2}$$

$$5 \quad m = L + \left(\frac{\frac{1}{2}N - F}{f_m} \right) C$$

$$6 \quad I = \frac{Q_1}{Q_0} \times 100$$

$$7 \quad \bar{I} = \frac{\Sigma W_i I_i}{\Sigma W_i}$$

$$8 \quad {}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$9 \quad {}^n C_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

$$10 \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$11 \quad P(X=r) = {}^n C_r p^r q^{n-r}, p+q=1$$

$$12 \quad \text{Mean/min, } \mu = np$$

$$13 \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

$$14 \quad Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$$

GEOMETRY
GEOMETRI

1 Distance/jarak

$$= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

2 Mid point / Titik tengah

$$(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

3 A point dividing a segment of a line

*Titik yang membahagi suatu
tembereng garis*

$$(x, y) = \left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n}, \frac{ny_1 + my_2}{m+n} \right)$$

4 Area of a triangle/ Luas segitiga =

$$\frac{1}{2} (x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (x_2 y_1 + x_3 y_2 + x_1 y_3)$$

$$5 \quad |r| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$6 \quad \hat{r} = \frac{x\hat{i} + y\hat{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRI

1 Arc length, $s = r\theta$
Panjang lengkok, $s = j\theta$

2 Area of a sector, $A = \frac{1}{2}r^2\theta$

Luas sektor, $L = \frac{1}{2}j^2\theta$

3 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

$\sin^2 A + k \cos^2 A = 1$

4 $\sec^2 A = 1 + \tan^2 A$

$\sec^2 A = 1 + \tan^2 A$

5 $\operatorname{cosec}^2 A = 1 + \cot^2 A$

$\operatorname{cosec}^2 A = 1 + \cot^2 A$

6 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$

$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$

7 $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
 $= 2 \cos^2 A - 1$
 $= 1 - 2 \sin^2 A$

$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
 $= 2 \cos^2 A - 1$
 $= 1 - 2 \sin^2 A$

8 $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$

$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$

9 $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$

$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$

10 $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$

11 $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$

12 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$


13 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

14 Area of triangle/ Luas segitiga
 $= \frac{1}{2}ab \sin C$

THE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL DISTRIBUTION N(0, 1)
KEBARANGKALIAN Hujung ATAS Q(z) BAGI TABURAN NORMAL N(0, 1)

z	0									Minus / Tolak									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641	4	8	12	16	20	24	28	32	36
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247	4	8	12	16	20	24	28	32	36
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859	4	8	12	15	19	23	27	31	35
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483	4	7	11	15	19	22	26	30	34
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121	4	7	11	15	18	22	25	29	32
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776	3	7	10	14	17	20	24	27	31
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451	3	7	10	13	16	19	23	26	29
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148	3	6	9	12	15	18	21	24	27
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867	3	5	8	11	14	16	19	22	25
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611	3	5	8	10	13	15	18	20	23
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379	2	5	7	9	12	14	16	19	21
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170	2	4	6	8	10	12	14	16	18
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985	2	4	6	7	9	11	13	15	17
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823	2	3	5	6	8	10	11	13	14
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681	1	3	4	6	7	8	10	11	13
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559	1	2	4	5	6	7	8	10	11
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367	1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294	1	1	2	3	4	4	5	6	6
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233	1	1	2	2	3	4	4	5	5
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183	0	1	1	2	2	3	3	4	4
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143	0	1	1	2	2	2	3	3	4
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	0	1	1	1	2	2	2	3	3
2.3	0.0107	0.0104	0.0102								0	1	1	1	1	2	2	2	2
				0.00990	0.00964	0.00939	0.00914				3	5	8	10	13	15	18	20	23
								0.00889	0.00866	0.00842	2	5	7	9	12	14	16	16	21
2.4	0.00820	0.00798	0.00776	0.00755	0.00734						2	4	6	8	11	13	15	17	19
						0.00714	0.00695	0.00676	0.00657	0.00639	2	4	6	7	9	11	13	15	17
2.5	0.00621	0.00604	0.00587	0.00570	0.00554	0.00539	0.00523	0.00508	0.00494	0.00480	2	3	5	6	8	9	11	12	14
2.6	0.00466	0.00453	0.00440	0.00427	0.00415	0.00402	0.00391	0.00379	0.00368	0.00357	1	2	3	5	6	7	9	9	10
2.7	0.00347	0.00336	0.00326	0.00317	0.00307	0.00298	0.00289	0.00280	0.00272	0.00264	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8	0.00256	0.00248	0.00240	0.00233	0.00226	0.00219	0.00212	0.00205	0.00199	0.00193	1	1	2	3	4	4	5	6	6
2.9	0.00187	0.00181	0.00175	0.00169	0.00164	0.00159	0.00154	0.00149	0.00144	0.00139	0	1	1	2	2	3	3	4	4
3.0	0.00135	0.00131	0.00126	0.00122	0.00118	0.00114	0.00111	0.00107	0.00104	0.00100	0	1	1	2	2	2	3	3	4



3472/1

SULIT


Section A
Bahagian A

[40 marks]
[40 markah]

Answer **all** questions.
Jawab **semua** soalan.

- 1 Solve the simultaneous equations $3x + 2y + 1 = x^2 + 9x - y = 8$ [6 marks]
Selesaikan persamaan serentak $3x + 2y + 1 = x^2 + 9x - y = 8$ [6 markah]

- 2 In Diagram 1, point P , Q , R and S are the vertices of a parallelogram $PQRS$.
Dalam Rajah 1, titik P , Q , R dan S adalah bucu-bucu bagi segiempat selari $PQRS$



Given that , $Q(2,1)$, $R(5,2)$ and $\overrightarrow{OP} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$, where O is the origin,

Diberi $Q(2,1)$, $R(5,2)$ dan $\overrightarrow{OP} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$, di mana O adalah titik asalan,

express in terms of \mathbf{i} dan \mathbf{j}

ungkapkan dalam sebutan \mathbf{i} dan \mathbf{j}

- a) \overrightarrow{PR}
b) \overrightarrow{QS}

[3 marks]

[3 markah]

- c) The point P' is the reflection of P in the x -axis.

Titik P' adalah pantulan bagi titik P pada paksi- x

Show that the points P' , R and S are collinear and find the ratio $P'R : RS$. [3 marks]

Tunjukkan bahawa titik P' , R dan S adalah segaris dan cari nisbah $P'R : RS$.

[3 markah]

- 3 a) Prove that $\frac{\sin A}{\sin 2A} + \frac{\cos A}{1 + \cos 2A} = \sec A$ [3 marks]

Buktikan $\frac{\sin A}{\sin 2A} + \frac{\cos A}{1 + \cos 2A} = \sec A$ [3 markah]

- b) Solve the equation $2 \tan^2 x = \sec x + 1$ for $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ [5 marks]

Selesaikan persamaan $2 \tan^2 x = \sec x + 1$ bagi $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ [5 markah]

- 4 The masses, each to the nearest kg, of luggage collected at an airport were recorded and one entry, p , is missing as shown in Table 1.

Jisim-jisim, dalam kg terhampir, untuk bagasi yang dikumpulkan di sebuah lapangan kapal terbang telah direkodkan dan satu data, p , telah hilang seperti yang ditunjukkan di Jadual 1.

Mass (kg) <i>Jisim</i>	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of luggage <i>Bilangan Bagasi</i>	18	22	29	p	25

Table 1
Jadual 1

The mean mass of the luggage was 32.75 kg,

min jisim bagasi itu ialah 32.75 kg,

- a) Based on the data in Table 1 and without using the graphical method,
Berdasarkan kepada data di Jadual 1 dan tanpa menggunakan kaedah graf,

calculate,

hitung,

i. the value p ,

nilai p ,

ii. the median, of this distribution.

[4 marks]

Median, untuk taburan ini.

[4 markah]

b) Draw a histogram to represent the data in Table 1 and estimate the modal mass of this luggage distribution.

[3 marks]

Lukis sebuah histogram bagi mewakili data di Jadual 1 dan dapatkan nilai mod bagi taburan bagasi tersebut.

[3 markah]

5 a) Find the equation of the normal to the curve $y = x^3 + 2x^2$ at the point (1, -1).

[3 marks]

Cari persamaan normal kepada lengkung $y = x^3 + 2x^2$ pada titik (1,-1)

[3 markah]

b) Given that $y = \frac{8}{x^3}$, find the approximate change in y when x decreases from 2 to 1.98.

[3 marks]

Diberi $y = \frac{8}{x^3}$, cari nilai hampir dalam perubahan y apabila x menyusut dari 2 ke 1.98.

[3 markah]

6 Tin is extracted from the mineral ore obtained from a mine in Pahang. During the first year of operation the ore obtained yields 8000 kg of tin. With the increasing difficulty of mining, the production of tin in each subsequent year shows a decrease of 10 % on the previous year's production. Assuming that mining continues in the same way for an indefinite period of time,

Timah diekstrak dari bijih logam di sebuah lombong di Pahang. Pada tahun pertama beroperasi, lombong itu berupaya menghasilkan 8000kg timah setahun. Dengan bertambahnya kesulitan dalam perlombongan, penghasilan timah pada setiap tahun berikutnya telah berkurang sebanyak 10% daripada tahun sebelumnya. Anggapkan keadaan perlombongan begini berlanjutan untuk satu tempoh masa yang takterhinggaan.

Calculate,

Hitung,

- a) M, the maximum amount of tin which could possibly be extracted. [3 marks]

M, Kuantiti timah yang maksimum yang boleh diekstrakkan. [3 markah]

- b) For economic reasons, mining will be abandoned once the annual output of tin falls below 1000 kg.

Atas faktor ekonomi, perlombongan timah akan diberhentikan operasinya jika pengeluaran tahunannya kurang daripada 1000 kg.

Calculate the maximum number of complete years the mine will be in operation.

[4 marks]

Kira bilangan tahun genap lombong itu akan beroperasi.

[4 markah]

Section B

Bahagian B

[40 marks]

[40 markah]

Answer **four** questions from this section.

Jawab empat soalan daripada bahagian ini.

- 7 Use graph paper to answer this question.

Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

Table 2 shows the values of two variables, x and y obtained from an experiment.

Variable x and y are related by the equation $y = 10^{-A} b^x$, where A and b are constants.

Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y , yang diperolehi daripada satu eksperimen. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan

$y = 10^{-A} b^x$, dengan keadaan A dan b adalah pemalar.

x	15	20	25	30	35	40
y	0.15	0.38	0.95	2.32	5.90	14.80

Table 2

Jadual 2

- a) Plot $\log_{10} y$ against x , using a scale of 2 cm to represent 5 units on the x -axis and 2 cm to represent 0.5 units on the $\log_{10} y$ -axis.

Hence, draw the line of best fit.

[4 marks]

Plot $\log_{10} y$ melawan x , dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada paksi - x dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi - $\log_{10} y$.

Seterusnya, lukis garis lurus penyuaiian terbaik.

[4 markah]

- b) Use your graph in 7(a) to find the value of
Gunakan graf anda di 7(a) untuk mencari nilai

i. A

ii. b

iii. x when $y = 10$

[6 marks]

x apabila $y = 10$

[6 markah]

- 8 In Diagram 2, the points $A(1, 10)$ and $C(-3, 2)$ are opposite corners of a rhombus $ABCD$. The point B lies on the x -axis.

Dalam Rajah 2, titik $A(1, 10)$ dan $C(-3, 2)$ merupakan bucu-bucu yang bertentangan bagi sebuah rhombus $ABCD$. Titik B berada di atas paksi x .




Diagram 2
Rajah 2

Find,

Cari,

- a) the equation of the perpendicular bisector of AC [4 marks]
persamaan pembahagi dua sama serenjaang AC [4 markah]
- b) the area of the rhombus [3 marks]
luas rhombus itu. [3 markah]


A point P moves such that its distances from point A and point C are in the ratio 2:1.

Satu titik P bergerak supaya jaraknya dari titik A dan titik C adalah dalam nisbah 2:1.

- c) Find the equation of locus of P . [3 marks]
Cari persamaan lokus P [3 markah]

- 9 In Diagram 3, the region R is bounded by the line $y = 3x$, the curve $y = 4 - x^2$ and the x -axis.

Dalam Rajah 3, rantau berlorek R dibatasi oleh garis lurus $y = 3x$, lengkung $y = 4 - x^2$ dan paksi $-x$.



Calculate,

Hitung,

- a) the area of shaded region R. [5 marks]
luas rantau berlorek R. [5 markah]
- b) the volume generated when the shaded region R is revolved 360° about the x -axis. [5 marks]
Isipadu janaan apabila rantau berlorek R dikisarkan melalui 360° pada paksi $-x$. [5 markah]

- 10 a) An infectious flu virus is spreading through a school. The probability of a randomly selected student having the flu next week is 0.3.

Sejenis virus selsema berjangkit sedang merebak di sebuah sekolah.

Kebarangkalian seorang pelajar dipilih secara rawak akan menghadapi selsema pada minggu hadapan ialah 0.3.

Calculate, out of a class of 30 students, the probability of

Hitung kebarangkalian, daripada kelas yang mempunyai 30 orang pelajar, bahawa

- i . exactly 5 students will have the flu next week.

tepat 5 orang pelajar akan menghadapi selsema pada minggu hadapan

- ii less than 2 students will have the flu next week [5 marks]

kurang daripada 2 orang pelajar akan menghadapi selsema pada minggu hadapan. [5 markah]

- b) The length of steel rods produced by a machine is normally distributed with a standard deviation of 3 mm. It is found that 2.02 % of all the rods are less than 25mm long.

Panjang batang keluli yang dihasilkan oleh satu mesin tertabur secara normal dengan sisihan piawai 3 mm. Didapati 2.02 % batang keluli itu mempunyai panjang yang kurang dari 25 mm.

Find,

Hitung,

- i .the mean length of rods produced by the machine.

min panjang batang keluli yang dihasilkan oleh mesin itu.

- ii. the probability that length of the rod is between 30 mm to 32 mm.

[5 marks]

kebarangkalian panjang batang keluli itu yang berada di antara 30 mm hingga 32 mm [5 markah]

- 11 In Diagram 4, OAB is a sector of a circle, centre O , of radius 8 cm and angle AOB is 0.92 radians.

Dalam Rajah 4, OAB adalah sebuah sektor bulatan yang berpusat O , berjajari 8 cm dan sudut AOB ialah 0.92 radian.




Diagram 4
Rajah 4

The line AD is the perpendicular line from A to OB . $ODBC$ is a straight line.
Garis AD adalah garis serenjang dari A ke OB . $ODBC$ ialah satu garis lurus.

[Use/Guna $\pi = 3.142$]

Calculate

Hitung

- a) the perimeter of the region ADB , marked P , [5 marks]
perimeter untuk rantau ADB , berlabel P [5 markah]
- b) the area of the shaded region, marked Q [5 marks]
luas rantau berlorek yang berlabel Q [5 markah]

Section C
Bahagian C**[20 marks]**
[20 markah]

Answer two questions from this section.
Jawab dua soalan daripada bahagian ini.

- 12** A particle moves along a straight line and passed through a fixed point O. Its velocity, $v \text{ ms}^{-1}$, is given by $v = t^2 - 5t + 4$, where t is the time, in seconds, after passing through O.

Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O.

Halajunya, $v \text{ ms}^{-1}$, diberi oleh $v = t^2 - 5t + 4$, dengan keadaan t ialah masa, dalam saat, selepas melalui O.

[Assume motion to the right is positive.]

[Anggapkan gerakan ke arah kanan sebagai positif.]

Find,

- (a) the initial velocity, in m s^{-1} , [1 mark]
Halaju awal, dalam m s^{-1} [1 markah]
- (b) the maximum velocity, in m s^{-1} , [3 marks]
Halaju maksimum, dalam m s^{-1} , [3 markah]
- (c) the range of time when particle moves to the left, [2 marks]
julat masa t bila zarah bergerak ke arah kiri, [2 markah]
- (d) the total distance, in m , traveled by the particle in the first four seconds. [4 marks]
Jumlah jarak, dalam m , yang dilalui oleh zarah dalam empat saat pertama. [4 markah]

13 Table 3 shows the prices and the price indices of four items, P , Q , R and S , used to produce a cake.

Diagram 5 shows a bar charts which represents the relative quantity of item used.

Jadual 3 menunjukkan harga-harga dan indeks harga bagi empat jenis item P , Q , R dan S yang digunakan dalam penghasilan sebiji kek.

Rajah 5 menunjukkan carta bar yang mewakili kuantiti relatif bagi penggunaan item itu.

Item	Price per kg (RM) <i>Harga</i>		Price index for the year 2006 based on the year 2004.
	Year 2004	Year 2006	
P	1.35	x	120
Q	2.50	3.8	y
R	0.60	0.90	150
S	z	4.5	125

Table 3
Jadual 3




Diagram 5
Rajah 5

- (a) Find the value of x , y and z . [4 marks]
Cari nilai bagi x , y dan z . [4 markah]
- (b) Calculate the composite index for the production of the cake of the year 2006 based on the year 2004. [3 marks]
Kirakan indeks gubahan bagi kos penghasilan sebiji kek bagi tahun 2006 berasaskan tahun 2004. [3 markah]
- (c) The price of item P and R increased by 20 % from the year 2006 to the year 2008 whereas the price indices for item Q and S remains unchanged, find the expected composite index for the year 2008 based on the year 2004. [3 marks]
Harga bagi item P dan R bertambah 20 % dari tahun 2006 ke tahun 2008 manakala harga item Q dan S tidak berubah, cari indeks gubahan yang sepadan bagi tahun 2008 berasaskan tahun 2004. [3 markah]

14 A factory produces two components, A and B . In a particular day, the factory produced x pieces of component A and y pieces of component B . The production of the two components is based on the following constraints.

Sebuah kilang menghasilkan dua komponen, A dan B . Pada satu hari tertentu, kilang itu menghasilkan x keping komponen A dan y keping komponen B . Penghasilan komponen-komponen itu adalah berdasarkan kekangan berikut :

- I : The total numbers of component is not more than 500.
Jumlah kedua-dua komponen adalah tidak lebih 500,
- II : The number of component B produced is at most three times the number of component A ,
Bilangan komponen B yang dihasilkan adalah selebih-lebihnya tiga kali bilangan komponen A ,
- III : The minimum number of component B is 200.
Bilangan minimum komponen B ialah 200.

- (a) Write three inequalities, other than $x \geq 0$ and $y \geq 0$, which satisfy all the above constraints. [3 marks]

Tuliskan tiga ketaksamaan, selain $x \geq 0$ dan $y \geq 0$, yang memenuhi semua kekangan di atas, [3 markah]

- (b) Using a scale of 2 cm to 50 components on both axes, construct and shade the region R which satisfies all the above constraints. [3 marks]

Menggunakan skala 2 cm kepada 50 komponen pada kedua-dua paksi, bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas.

[3 markah]

- (c) Use your graph in 14(b), to find

Gunakan graf anda di 14(b) untuk mencari,

- (i) the maximum number of component A if the number of component B produced on a particular day is 300. [1 mark]

Bilangan maksimum komponen A jika bilangan komponen B yang dihasilkan pada satu hari tertentu ialah 300. [1 markah]

- (ii) The maximum total profit per day if RM 25 and RM 20 are the profit from the sales of component A and B respectively. [3 marks]

Jumlah keuntungan maksimum sehari jika RM 25 dan RM 20 adalah keuntungan daripada jualan komponen A dan B masing-masing.

[3 markah]

15 Diagram 6 shows quadrilateral PQRS.

Rajah 6 menunjukkan sisiempat PQRS.




Diagram 6

Rajah 6

(a) Calculate

Hitungkan

(i) the length, in cm, of QS. [2 marks]

panjang, dalam cm bagi QS, [2 markah]

(ii) $\angle QRS$ if $\angle QRS$ is an obtuse angle. [2 marks]

$\angle QRS$ jika $\angle QRS$ adalah sudut cakah. [2 markah]

(b) Point Q' lies on QS such that $PQ' = PQ$.

Titik Q' terletak di atas QS dengan keadaan $PQ' = PQ$

(i) Copy $\triangle QPS$ and show $\triangle Q'PS$ in $\triangle QPS$. [1 mark]

Salin $\triangle QPS$ dan tunjukkan $\triangle Q'PS$ dalam $\triangle QPS$. [1 markah]

(ii) calculate the area, in cm^2 , of $\triangle Q'PS$ [5 marks]

Hitung luas, dalam cm^2 , bagi $\triangle Q'PS$ [5 markah]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT

NAMA:

KELAS :

NO. KAD PENGENALAN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANGKA GILIRAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arahan Kepada calon

- 1 Tulis **nama, kelas, nombor kad pengenalan** dan **angka giliran** anda pada ruang yang disediakan.
- 2 Tandakan (\surd) untuk soalan yang dijawab.
- 3 Ceraikan helaian ini dan ikat sebagai muka hadapan bersama-sama dengan kertas jawapan.

<i>Kod Pemeriksa</i>				
Bahagian	Soalan	Soalan Dijawab	Markah Penuh	Markah Diperoleh <i>(Untuk Kegunaan Pemeriksa)</i>
A	1		6	
	2		6	
	3		8	
	4		7	
	5		6	
	6		7	
B	7		10	
	8		10	
	9		10	
	10		10	
	11		10	
C	12		10	
	13		10	
	14		10	
	15		10	

INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTUK CALON

- 1** This question paper consists of three sections : **Section A, Section B** and **Section C**.
*Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: **Bahagian A, Bahagian B** dan **Bahagian C**.*
- 2** Answer **all** questions in **Section A**, **four** questions from **Section B** and **two** questions from **Section C**.
*Jawab **semua** soalan dalam **Bahagian A**, **empat** soalan daripada **Bahagian B** dan **dua** soalan daripada **Bahagian C**.*
- 3** Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapat markah.
- 4** The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
- 5** The marks allocated for each question and sub –part of a question are shown in brackets.
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.
- 6** A list of formulae is provided on page 2 to 4.
Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 hingga 4
- 7** You may use a non-programmable scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram

SULIT
3472/1
Additional
Mathematics
Kertas 1
Peraturan
Pemarkahan
September
2008


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
TAHUN 2008

ADDITIONAL MATHEMATICS

KERTAS 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Question	Working / Solution	Marks	Total
1 (a)	$q = 5$	1	
1 (b)	one to one or 1 to 1	1	2
2 (a)	$\frac{3+x}{4}$ or equivalent	2	
	$3 - \frac{3-x}{2}$	B1	
2(b)	$3 - 2x$	2	
	$x = 3 - 2y$ or equivalent	B1	4
3	$p < \frac{q+1}{4(1-q)}$	3	
	$4p < \frac{(q+1)^2}{1-q^2}$ or equivalent (gathering of q terms)	B2	
	$(q+1)^2 - 4p(1-q^2)$	B1	3
4	$-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}$ or $-0.3333 \leq x \leq 0.5$	4	
	$-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$ OR 	B3	
	Must indicate the range correctly by shading or other ways		
	$x = -\frac{1}{3}$ and $x = \frac{1}{2}$	B2	
	(both values must be seen)		
	$(3x+1)(2x-1)$	B1	4
	Accept '=' or any inequality signs '>', '<', '≤', '≥'		

5	1 $\log_{10} \frac{x^4 y^6}{y^2} = 4$ or $\log_{10} \frac{x^3 y^6}{y^2} + \log_{10} x = 4$ or $\log_{10} x^4 y^6 - \log_{10} y^2 = 4$ or $\log_{10} x^3 y^6 + \log_{10} \frac{x}{y^2} = 4$ or equivalent (combining at least two terms of log correctly in a correct equation) $\log_{10} x^3 y^6$ or $\log_{10} y^2$ or $\log_{10} 10^4$	3 B2 B1	3
6	17.65 or 17.63 $x = \frac{\log_{10} 25}{\log_{10} 1.2}$ or $x = \frac{2 \log_{10} 5}{\log_{10} 6 - \log_{10} 5}$ or equivalent $\log_{10} \left(\frac{6}{5}\right)^x = \log_{10} 25$ or $\log_{10} 6^x = \log_{10} 5^{x+2}$ or $\log_{10} (3^x \times 2^x) = (x+2) \log_{10} 5$ or equivalent 6^x or $5^x (5^2)$ or $\log_{10} (3^x \times 2^x) = \log_{10} 5^{x+2}$	4 B3 B2 B1	4
7	5(13p + 11q) or equivalent $\frac{10}{2}[2(2p + q) + (10 - 1)(p + q)]$ $3p + 2q - (2p + q)$ or $4p + 3q - (3p + 2q)$	3 B2 B1	3
8 (a)	13122 $a = 2$ or $r = 3$ or seen	2 B1	
8(b)	$1\frac{2}{99}$ or equivalent $a = 0.02$ and $r = 0.01$ or seen	2 B1	4

9	$(10, 7)$ $\frac{4(0) + 1(h)}{1 + 4} = 2$ or $\frac{4(2) + 1(k)}{1 + 4} = 3$ $P(0, 2)$	3 B2 B1	3
10	-6 $mPQ = 2$ $P(4, 2)$	3 B2 B1	3
11	$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ $2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$	2 B1	2
12	$\frac{1}{17} (15\mathbf{i} + 8\mathbf{j})$ or equivalent $\sqrt{15^2 + 8^2}$ $4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 11\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$	3 B2 B1	3
13	$-\frac{1}{2}\mathbf{x} + 4\mathbf{y}$ $\frac{2}{3}(6\mathbf{y} - 3\mathbf{x}) + \frac{1}{2}(3\mathbf{x})$ or equivalent $\overrightarrow{AS} = \frac{2}{3}(6\mathbf{y} - 3\mathbf{x})$ $(6\mathbf{y} - 3\mathbf{x})$ or $\frac{1}{2}(3\mathbf{x})$ or $AS = \frac{2}{3}QS$	4 B3 B2 B1	4

14	108 $3(-12)(5-3x)^2(-3)$ or equivalent $4(5-3x)^3(-3)$ or equivalent	3 B2 B1	3
15	10 $\frac{dp}{dt} = \left(3 - \frac{2}{2^2}\right) \times 4$ $\frac{dp}{dq} = 3 - \frac{2}{q^2}$ or equivalent	3 B2 B1	3
16	$y = 10x^2$ $\log_{10} y = \log_{10} x^2 + \log_{10} 10$ or $\log_{10} \frac{y}{x^2} = 1$ or equivalent $\log_{10} y = 2 \log_{10} x + 1$ $mPQ = 2$	4 B3 B2 B1	4
17	3 $\left[\frac{k}{(2x-5)^3} \right]_2^3 + [x]_2^3 = 7$ or equivalent $\int_2^3 g(x)dx + \int_2^3 dx = 7$	3 B2 B1	3
18	$y = -\frac{1}{8}(3-2x)^4 + 2\frac{1}{8}$ or equivalent $2 = -\frac{(3-2 \times 1)^4}{8} + c$ or equivalent $\frac{(3-2x)^4}{-2(4)}$ or equivalent	3 B2 B1	3

19	20 $4 + 4\left(\frac{3}{2}\right) + 4 + 4\left(\frac{3}{2}\right)$ or equivalent $12 = \frac{1}{2}(4^2)\theta$	3 B2 B1	3
20	$a = 2, b = \frac{3}{2}, c = 0$ Any two of a, b or c correct Any one of a, b or c correct	3 B2 B1	3
21	$90^\circ, 123.69^\circ (123^\circ 41'), 270^\circ, 303.69^\circ (303^\circ 41')$ $\cos x = 0$ and $\tan x = -\frac{3}{2}$ $\cos x(3\cos x + 2\sin x) = 0$ $3\cos^2 x + 2\sin x\cos x = 0$	4 B3 B2 B1	4
22	277200 ${}^{12}C_4 \times {}^8C_3 \times {}^5C_2$ or $495 \times 56 \times 10$ or equivalent ${}^{12}C_4$ or 8C_3 or 5C_2 or 495 or 56 or 10 or equivalent	3 B2 B1	3
23	$\frac{1}{15}$ or an equivalent single fraction $\frac{3}{6} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{6}$ $\frac{3}{6}$ or $\frac{2}{5}$ or $\frac{2}{6}$	3 B2 B1	3

24(a)	$\frac{14}{5}$ or 2.8	1	
24(b)	1.296	2	
	$7 \times \frac{2}{5} \times \left(1 - \frac{2}{5}\right)$ or equivalent	B1	3
25 (a)	1.1	1	
25(b)	61.2	2	
	$\frac{70 - \mu}{8} = *1.1$ (his k)	B1	3

SULIT

**3472/2
Additional
Mathematics
Paper 2
September
2008**

**SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PELAJARAN PAHANG**

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

TAHUN 2008

ADDITIONAL MATHEMATICS

Paper 2

MARKING SCHEME


This marking scheme consists of 12 printed pages


Question	Working / Solution	Marks	Total
4(a)(i)	$\frac{22(18) + 27(22) + 32(29) + 37(p) + 42(25)}{18 + 22 + 29 + p + 25} = 32.75$	K1	7
	$p = 26$	N1	
(ii)	$\text{median} = 29.5 + \left(\frac{60 - 40}{29}\right)(34.5 - 29.5)$	K1	
	$= 32.95$	N1	
4(b)	Height of the bars proportional to the frequency or Label the lower and upper boundaries/mid points/class interval correctly. Correct way of finding the value of mode. Modal mass = 33	K1 K1 N1	
5(a)	$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 4x$ $(1, -1), \frac{dy}{dx} = 7$ Gradient of normal = $-\frac{1}{7}$ Equation of normal: $y - (-1) = -\frac{1}{7}(x - 1)$ $7y + x + 6 = 0$	K1 K1 K1	6
5(b)	$\frac{dy}{dx} = -24x^{-4}$ $\frac{\delta y}{\delta x} \approx \frac{-24}{2^4}(1.98 - 2)$ ≈ 0.03	K1 N1	
6(a)	A = 8000 8000, 8000(0.9), 8000(0.9) ² , ... r = 0.9 $s_n = \frac{8000}{1 - 0.9}$ $= 80,000$	P1 K1 N1	

Question	Working / Solution	Marks	Total														
6(b)	$8000(0.9)^{n-1} > 1000$ $(n-1) \log_{10} (0.9) > \log_{10} \left(\frac{1}{8} \right)$, taking log both sides $n < 20.74$ $n = 20$	P1 K1 K1 N1	7														
7(a)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>lg y</td> <td>-0.82</td> <td>-0.42</td> <td>-0.022</td> <td>0.37</td> <td>0.77</td> <td>1.17</td> </tr> </table> <p>Plot $\log_{10} y$ against x 6 points plotted correctly</p> <p>Line of best fit, (passes through as many points as possible and balance in terms of numbers point appear above and below the line, if any .)</p>	x	15	20	25	30	35	40	lg y	-0.82	-0.42	-0.022	0.37	0.77	1.17	N1 K1 N1 N1	
x	15	20	25	30	35	40											
lg y	-0.82	-0.42	-0.022	0.37	0.77	1.17											
7(b)	$\log_{10} y = -A \log_{10} 10 + x \log_{10} b$ i. y-intercept, $c = -A \log_{10} 10$ $-2.05 = -A \log_{10} 10$ $A = 2.05$ ii. $m = \log_{10} b = 0.08$ $b = 1.2$ iii. 37.5	P1 P1 N1 K1 N1 N1															
8(a)	Mid point of AC $\left(\frac{1+(-3)}{2}, \frac{2+10}{2} \right)$ $(-1, 6)$ Gradient of AC $= \frac{10-2}{1-(-3)}$ $= 2$ Gradient of perpendicular line to AC $= -\frac{1}{2}$ Use of $m_1 m_2 = -1$ Equation of perpendicular bisector AC $(y-6) = -\frac{1}{2}(x+1)$ $2y + x = 11$ or equivalent (b) $y=0, x=11 \Rightarrow B(11, 0)$ Area of rhombus ABCD $= 2 \times \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -3 & 11 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & 10 & 2 \end{vmatrix}$ $= 120$	N1 K1 K1 N1 K1 K1 N1	10														

Question	Working / Solution	Marks	Total
8(c)	Use of distance formula for PA or PC $PA = \sqrt{(x-1)^2 + (y-10)^2}$ or $PC = \sqrt{(x+3)^2 + (y-2)^2}$ Use $2PC = PA$, $2\sqrt{(x+3)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(x-1)^2 + (y-10)^2}$ $3x^2 + 3y^2 + 26x + 4y - 49 = 0$	K1 K1 N1	10
9(a)	$y = 3x$, $y = 4 - x^2$ $(x+4)(x-1) = 0$ solve simultaneous equation $x = 1$, $x = 4$ $4 - x^2 = 0$, $x = \pm 2$ or find the limits of integration Use area of triangle $= \frac{1}{2}(1)(3) = \frac{3}{2}$ or Integrate $\int_0^1 (3x) dx$ or $\int_1^2 (4 - x^2) dx$ $\left[\frac{3x^2}{2} \right]_0^1$ or $\left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_1^2$ Substitution, $\left[8 - \frac{8}{3} \right] - \left[4 - \frac{1}{3} \right]$ $= 1\frac{2}{3} \text{ unit}^2$ Add up 2 area, $\frac{3}{2} + 1\frac{2}{3}$ $3\frac{1}{6} \text{ unit}^2$	K1 K1 K1 N1	
(b)	Volume of cone $= \frac{1}{3}\pi(3)^2(1) = 3\pi$ or $\pi \left[\frac{9x^3}{3} \right]_0^1$ 3π $\pi \int_1^2 (4 - x^2)^2 dx$ $= \pi \left[16x - \frac{8x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_1^2$ $= \pi \left\{ \left[16(2) - \frac{8(2)^3}{3} + \frac{2^5}{5} \right] - \left[16(1) - \frac{8(1)^3}{3} + \frac{1^5}{5} \right] \right\}$	K1 K1 K1	


Question	Working / Solution	Marks	Total
	$= 3 \frac{8}{15} \pi$ <p>Volume generated = $3\pi + 3 \frac{8}{15} \pi$</p> $= 6 \frac{8}{15} \pi$	N1 N1	10
10(a) i.	<p>$p = 0.3$ or $q = 0.7$</p> <p>$P(X=5) = {}^{30}C_5 (0.3)^5 (0.7)^{25}$ Use of $P(X=r) = {}^n C_r (p)^r (q)^{n-r}$</p> <p>$= 0.04644$</p>	P1 K1 N1	
ii.	<p>$P(X < 2) = P(X=0) + P(X=1)$</p> <p>${}^{30}C_0 (0.3)^0 (0.7)^{30} + {}^{30}C_1 (0.3)^1 (0.7)^{29}$</p> <p>$= 0.0009660$ or 9.660×10^{-4}</p>	K1 N1	
(b)i	<p>$P(z < c) = 0.202$</p> <p>$C = -2.05$</p> <p>$-2.05 = \frac{25 - \mu}{3}$, use of $z = \frac{X - \mu}{\sigma}$</p> <p>$\mu = 31.15 \text{ mm}$</p>	N1 K1 N1	
ii	<p>$P\left(\frac{30 - 31.15}{3} < z < \frac{32 - 31.15}{3}\right)$</p> <p>$= 1 - 0.3509 - 0.3885$</p> <p>$= 0.2607$</p>	K1 N1	10
11(a)	<p>Arc length AB = $8(0.92)$</p> <p>$= 7.36$</p> <p>$0.92 \text{ rad} = 52.71^\circ / 52^\circ 42'$</p> <p>$\sin(52.71^\circ) = \frac{AD}{8}$</p> <p>$= 6.364$</p> <p>$\cos(52.71^\circ) = \frac{OD}{8}$</p> <p>$= 4.848$</p> <p>DB = $8 - 4.848 = 3.152$</p> <p>Perimeter = $3.152 + 6.364 + 7.36$ (add all the sides)</p> <p>$= 16.88$</p>	K1 K1 K1 K1 N1	
11(b)	<p>$\tan(52.71^\circ) = \frac{AC}{8}$</p> <p>$= 10.50$</p> <p>Area of OAC = $\frac{1}{2}(8)(10.50)$</p> <p>$= 42.01$</p>	K1 K1	

Question	Working / Solution	Marks	Total
11(b)	Area of sector OAB = $\frac{1}{2}(8)^2(0.92)$ use of $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ = 29.44 Area of the shaded region Q, = 42.01 - 29.44 = 12.57	K1 K1 N1	10
12	(a) $v = 4$ (b) $v_{\max}, a = 0$ $a = 2t - 5 = 0$ $t = \frac{5}{2}s$ $v_{\max} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 5\left(\frac{5}{2}\right) + 4$ $v_{\max} = -2\frac{1}{4}ms^{-1}$ (c) used $v < 0$ $t^2 - 5t + 4 < 0$ $(t-1)(t-4) < 0$  $1 < t < 4$ (d) $s = \int (t^2 - 5t + 4)dt$ $= \left[\frac{t^3}{3} - \frac{5t^2}{2} + 4t \right]_0^1 + \left[\frac{t^3}{3} - \frac{5t^2}{2} + 4t \right]_1^4$ Substitute the values of t $= 23\frac{2}{3}m$	P1 K1 K1 N1 K1 N1 K1K1 K1 N1	10
13	(a) use $\frac{P_1}{P_0} \times 100$ $x = 1.62, y = 152, z = 3.60$ used $\bar{I} = \frac{\sum Iw}{\sum w}$ $\bar{I} = \frac{120(4) + 152(5) + 150(2) + 125(3)}{14}$ = 136.79	K1N1N1N1 K1 K1(used I) N1	


Question	Working / Solution	Marks	Total
	(c) $I_P = 144, I_R = 180$ $\bar{I} = \frac{194.4(4) + 152(5) + 108(2) + 125(3)}{14}$ $= 147.93$	P1 K1 N1	10
14	(a) I $x + y \leq 500$ II $y \leq 3x$ III $y \geq 200$ Cannot have sign '=' (b) One of graph of straight line is correct All the graph of straight line are correct The shaded region of R is correct (c) (i) 200 (ii) maximum point (300,200) – based on the Graph $25(300) + 20(200)$ - substitute any number based on the value in shaded region 11500	N1 N1 N1 K1 K1 N1 N1 N1 K1 N1	10
15	(a) used cosine rule $QS^2 = (10.5)^2 + (12.5)^2 - 2(10.5)(12.5)\cos 80^\circ$ $QS = 14.86 \text{ cm}$ (b) used sine rule $\frac{\sin R}{14.86} = \frac{\sin 35}{9.5}$ $\sin R = 0.89719$ $\angle QRS = 116.21^\circ$  (i) Can see anywhere in the diagram (ii) Find $\angle PQS$, used sine rule, hence find $\angle QPQ'$ $\frac{\sin \angle PQS}{12.5} = \frac{\sin 80^\circ}{14.86}$ $\angle PQS = 55.93^\circ,$ $\angle QPQ' = 68.14^\circ$	K1 N1 K1 N1 N1 K1	

Question	Working / Solution	Marks	Total
	Find area of ΔPQS or area of $\Delta PQQ'$ $\text{area}\Delta PQS = \frac{1}{2}(10.5)(12.5)\sin 80^\circ$ $= 64.63\text{cm}^2$ $\text{area}\Delta PQQ' = \frac{1}{2}(10.5)(10.5)\sin 68.14^\circ$ $= 51.16 \text{ cm}^2$	K1 N1	
	Find the area of $\Delta Q'PS$ $= 64.63 - 51.16$ $= 13.47$ Or any other methods	K1 N1	10

Graph For Question 4(b)



No.7(a)



- K1
- N1
- N1

Graph for Question 14(b)

